

16.97905
0913X

PREGNANCY

ILLINOIS
DEPOSITORY

JUL 11 2002

UNIVERSITY OF ILLINOIS
AT URBANA-CHAMPAIGN

**If this test is positive,
there's another one you should take.**

If you're pregnant or thinking about getting pregnant, you need to know if you have HIV, the virus that causes AIDS. Knowing your HIV status may save your baby's life, since pregnant women can pass the virus to their babies. In fact, most children have AIDS because their mothers passed HIV to them during pregnancy, at the time of birth or through breastfeeding.

New research shows that if you are HIV positive, there are treatments available to reduce the chances your baby will be infected with HIV.

Unfortunately, many people do not know they have HIV because they do not show signs of being infected. You should know, however, that most women infected with HIV are between the ages of 14 and 44. You should also know that women are more likely than men to become infected with HIV through sex.

So, find out about your HIV status for you and your baby. Remember, your baby doesn't have to get HIV.

To learn more about HIV and pregnancy, first ask a doctor. To find out about AIDS/HIV testing and counseling near you, call the Illinois Department of Public Health AIDS/HIV & STD Hotline at 1-800-243-2437, TTY (hearing impaired use only) 1-800-782-0423.

ILLINOIS DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH
1-800-243-2437
AIDS/HIV & STD HOTLINE

TTY 1-800-782-0423
Illinois Department
of Public Health

PRUEBA DE EMBARAZO



3 0112 042554813

**Si esta prueba es positiva,
hay otra que debe hacerse.**

Si está embarazada o piensa quedar embarazada, necesita saber si tiene el VIH, el virus que causa el SIDA.


Saber cual es su condición en cuanto al VIH pudiera salvar la vida de su bebé ya que las mujeres embarazadas pueden transmitir el virus VIH a sus bebés. Es un hecho que la mayoría de los niños con SIDA han sido infectados embarazo, al momento del nacimiento o en la leche materna.

Nuevas investigaciones demuestran que si usted ha contraído VIH, hay tratamientos para reducir las oportunidades de que su bebé sea infectado por el mismo virus.

Desafortunadamente, muchas mujeres no saben que tienen VIH porque no presentan síntomas de estar infectadas. Usted debe saber, sin embargo, que la mayoría de las mujeres infectadas con el VIH tienen entre 14 y 44 años de edad. También debe saber que las mujeres tienen más probabilidades de quedar infectadas con VIH, a través de las relaciones sexuales, que los hombres.

De modo que debe saber cual es su condición en cuanto al VIH, tanto por usted como por su bebé. Recuerde, su bebé no tiene por qué contraer el VIH:

Para mayor información sobre el VIH y el embarazo, primero consulte a un médico. Para mayor información acerca de pruebas y consejo sobre SIDA/VIH, llame a la Línea Directa Informativa sobre SIDA/VIH y ETS del Departamento de Salud Pública de Illinois al 1-800-243-2437. Para aquellos con impedimento auditivo, el número es 1-800-782-0423



TTY 1-800-782-0423
Departamento de
Salud Pública de Illinois